

Pályázati pénz a sürgősségi ellátás formáinak fejlesztésére

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával 26 magyarországi kórház sürgősségi osztálya válhat európai színvonalú, modern központtá. A sürgősségi ellátást célzó Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt pályázat eredeti, 8,8 milliárd forintos támogatási keretét további 3,2 milliárd forinttal központi-lag megemelték.

■ **Sürgősségi téren a belgyógyászati és a baleseti ellátást fejlesztik.**

A három Békés megyei kórház is részesült a pályázati pénzből. Mint dr. Kovács Józseftől, a megyei Pándy-kórház főigazgatójától megtudtuk, ők közel 510 millió forintot kapnak. Jelentős infrastruktúra-fejlesztések történnek: bővül a diagnosztikai és terápiás gépműszerpark, eszközbeszerzések valósulnak meg, szállítóeszközöket szereznek be, épületeket akadálymentesítenek, valamint diszpécserrendszereket alakítanak ki. Az egységes informatikai rendszerekkel a szolgáltatásokhoz való jobb és gyorsabb hozzáférést lehet majd biztosítani. A meglévő sürgősségi osztály korszerűsítésére, valamint magasabb szintre történő fejlesztésére gondolnak. A diagnosztikai centrum magassávszintjén beléptetés, belgyógyászati típusú és baleseti ellátási formák segítenek a betegeken.

Cukrosok szemvizsgálata

FUNDUSKAMERA A szövődmények súlyos látásromláshoz vezethetnek



A funduskamera-ellenőrzések elsősorban a cukrosok állapotvizsgálatához, de más jellegű szemkárosodások szemfenéki vizsgálatához is alkalmasak.

— Az utóbbi öt év során valósulnak meg fejlesztő álmaim — mondta dr. Pelle Zsuzsanna, a szemészeti osztály vezető főorvosa. — A glaukómaambulancia, a cukorbeteg-szakrendelés, a gyerekszakrendelés azonos helyen lesz.

Most megkapták a digitális funduskamerát is. A diabetes mellitus (cukorbetegség) szemészeti szövődményei a betegek közel egyharmadánál lépnek fel, és minden tizedik cukorbeteg esetében súlyos látásromláshoz vezetnek. Hazánkban a diabeteses retinopathia (szemfenéki szövődmény) a második leggyakoribb vaksági ok.

Statisztikák szerint a diabetes mellitus 30 éves fennállása után csaknem minden betegen kialakul a retinopathia diabétesis valamilyen formája, és a 65–74 év közötti diabeteses betegek 14–20 százaléka vak. A retinopathia gyakorisága hazánkban 16 százalék. Az 1996–2000. évekre vonatkozó, négy megyére kiterjedő vaksági statisztikai felmérés alapján Magyarországon évente mintegy ezer ember veszti el látását a cukorbetegség szemészeti szövődményei miatt.

A diabetes mellitus szemészeti jelentőségét tehát kiemeli, hogy ez a leggyakrabban vaksághoz vezető szisztémás betegség. A cukorbetegség között a retinopathias (érrendszeri szövődmény szemészeti részjelensége) esetek kiszűrése fontos népegészségügyi feladat. Tekintettel arra, hogy a páciensek alapteregségének gondozása nem a szemészeknél történik, a retinopathia szűréséhez a belgyógyász, diabetológus, endokrinológus, háziorvos és a szemész szoros együttműködése szükséges.

Nagyon fontos a cukorbeteg

gek megfelelő időpontban történő szemészeti vizsgálata és a szükséges kezelések elvégzése. A szűréshez a legmegfelelőbb

■ **Állandó figyelemmel követik a cukorbeteg szemfenéki szövődményét.**

speciális szemészeti műszer a funduskamera. Hasznos eszköz fundusfotó készítéséhez, segít az állapot rögzítésében, a progresszió megállapításában, a kezelésre adott válasz megítélésében.

FLAG (fluoreszcein angi-

ográfia): a könyökvénába festékanyagot juttatnak, és követik a szemfenéki érrendszerben való megjelenését, útját. Nem rutinszerűen alkalmazandó eljárás, elvégzése javasolt minden olyan esetben, amikor a látásromlás a szemfenéki kép alapján nem magyarázható. Kétes esetekben alkalmazható a neovascularisatio (érújdonképződés), illetve intraretinalis microvascularis abnormalitás elkülönítésében. Természetesen a funduskamera, a FLAG-vizsgálat a diabeteszen kívül más szemészeti kórképekben is rendkívül fontos: glaukómában a papillakép rögzítésében, az excavatio, az idegrostréteg pusztulása progressziójának követésében, a különböző típusú macula- (sárgafolt-)degenerációk elkülönítésében, a chorioidea festékes elváltozásainak, tumoros betegségeknek differenciál diagnosztikájában, a szemfenéki érrendszeri betegségek diagnosztikájában, az ideghártya különböző degeneratív és gyulladásos betegségeinek elkülönítésében.

A Pándy Kálmán kórházban működő szemészeti diabetes szakrendelés három munkanapon (hétfő, kedd, szerda) fogadja a betegeket 8–14 óra között, előjegyzés alapján.

Ingyenes szűrést szerveztek, táplálkozási tanácsokat adtak

Az intézmény idén is részt vett a Gyulasport Kht. által szervezett rendezvényen, melynek keretén belül ingyenes szív- és érrendszeri szűrést, táplálkozási tanácsadást biztosítottak az érdeklődők részére.

■ **A két nap alatt közel kétszázan éltek a lehetőséggel.**

Beke Szilvia egészségnevelő tartja kézben a kórháznak ezt a megelőző tevékenységét. A két nap alatt közel kétszázan éltek a lehetőséggel, akik közül többeket visszairányítottak a háziorvoshoz, mivel értékeik kimagaslóan magasak voltak. A leggyakoribb problémaként a túlsúly, illetve a magas vérnyomás jelentkezett, de több esetben találtak igen magas koleszterin-értékkel is. Mindezek az egészséget alattomosan támadó, veszélyeztető tényezők megfelelő tájékoztatással, életmódbeli változtatásokkal megelőzhetők.

Beke Szilvia ezúton szeretne minden kedves kollégának köszönetet mondani, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Dr. Kovács József a Vöröskereszt megyei elnöke

A megyei kórház főigazgatója tavaly őszől a megyei Vöröskereszt elnöke és az Országos Vöröskereszt alelnöke. Intézményvezetői munkája mellett országos szinten az önkéntes véradás, vérellátás koordinálása a feladata. Felelősségteljes ez a gyógyítást segítő tevékenység, hiszen az utóbbi években nehezebbé vált a véradásszervezés, bár az önkéntességi elvek érvényesítése időtlen jelentőségű.

Megyénk véradói országos összehasonlításban mindig élen jártak, s ezt a meggyőződést sikerül a fiatalok között is elhínteni. Jó példa erre a mezőkovácsházi Hunyadi János Közoktatási Intézmény, amely a Vöröskereszt mintaiskolája. Vendégségben járt már náluk a Vöröskereszt elnöke, dr. Habsburg György is.



Az oldal a Békés Megyei Képviselő-testület Pándy Kálmán Kórházának támogatásával készült.

Internet: www.pandy.hu
E-mail: hospital@pandy.hu

Haikukiállítás a kórházban

TÁRLAT Tollat ragadtak az Implom-iskola diákjai

A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény Implom József Általános Iskola tagintézményének tanulói a közelmúltban úgy döntöttek, tollat ragadnak és megörvendeztetik a betegeket az általuk elkészített különleges alkotásaikkal. (A haiku a japán költészet egyik jellegzetes versformája, mely a 20. század elejétől egyre több nyelv irodalmában megjelent.)

A Pándy Galériából a diagnosztikai tömbbe kerülnek a képek, s versek, amelyekkel a tehetséggondozó szakkör tanulói és mentoruk, Kolozsi Ildikó tanárnő kívánja a kórházi környezetet hangulatosabbá tenni a betegek és a dolgozók számára.



Hangulatosabbá tették a kórházi környezetet a szakkör tanulói.

Hívatlan vérszívó a kullancs

KÓROKOZÓ A kertben vagy kiránduláskor is támadhat

Különösen április-júniusban és szeptemberben veszélyesek a kullancsok. Csípésük többnyire fájdalommentes, így észrevétlen marad, mivel a szúrás után a fertőzött kullancs nyálmirigyéből a megbetegedést előidéző kórokozók csak a beszűrését követő 4–6 óra múlva, a felesleges vér visszaöklendezésekor kerülnek az emberbe.

A kullancs-encephalitis vírusát a vadon élő állatokról az emberre a kullancs viszi át. A fertőzés jelentős része tünetmentesen, kisebb része pedig influenza emlékeztető tünetekkel, lázzal, fejfájással, rossz közérzettel zajlik le. Egyes esetekben

súlyos idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak. A betegség általában teljes gyógyulással vég-

■ **Mindkét megbetegedés gyanújakor haladéktalanul forduljunk orvoshoz!**

ződik. A védőoltásoknak köszönhetően évente 46–84 megbetegedés fordul elő.

A Lyme-kórt a vadon élő állatokról a kullancsra kerülő és ott elszaporodó baktérium (*Borrelia burgdorferi*) okozza. Legjellegzetesebb klinikai tünete a vándorló bőrpír, amely általában néhány napos lapangási idő után a csípés he-

lyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis, kerek folt formájában kezdődik, majd terjedve, középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrelváltozást enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphet magas láz, fej- és izomfájdalom, agyi izgalomra utaló tünet is. Igen ritkán, a kullancscsípés után 1–2 hónap múlva szívpanaszok és neurológiai tünetek (zsibbadás, végtagfájdalom, perifériás ideggyulladás) is jelentkezhetnek. Legtöbbször semmilyen társ tünete nincs. Évente 992–1258 igazolt eset fordul elő, viszonylag jóindulatú és gyógyítható.

■ Nagyné Vigh Katalin